


# CBC : aspect cliniques

## Formes « débutantes » - localisations visage



# CBC : aspect cliniques

## Formes plus évoluées - autres localisations



# CBC : aspect cliniques

## Formes évoluées



**Après une évolution lente,  
le plus souvent en surface,  
parfois en profondeur**

**Pouvoir local destructeur  
(mais pas de métastases)**

**La localisation  
conditionne le pronostic  
car peut compliquer le geste chirurgical**



**Un diagnostic précoce  
évite des évolutions dramatiques avec  
des séquelles post-thérapeutiques sévères**

# Traitements

**Exérèse chirurgicale avec marges de 3-4 mm (parfois 1 cm)**



**Autres traitements possibles pour les CBC superficiels**


Topique immunomodulateur (imiquimod)  
Photothérapie dynamique

# Carcinomes épidermoïdes et Kératose actiniques

Lésions du sujet âgé atteignant les zones photo-exposées

Posent le problème du diagnostic différentiel  
sachant

que la **kératose actinique** fait le « lit » du **carcinome épidermoïde**



# Kératose actiniques

Très fréquent ; plus fréquent chez les hommes

Touche surtout les peaux claires

Sur les zones photoexposées : visage, mains, cuir chevelu dégarni

Diagnostics différentiels

**Kératoses séborrhéiques**

« verrue séborrhéique »

Pas d'évolution vers un CSC

**Carcinome épidermoïde**

Transformation en CE

de 5 à 20 % des KA en 10 à 25 ans

Se méfier si évolution rapide,  
infiltration, ulcération, saignement  
=> biopsie



Traitement (selon volonté du patient)  
cryothérapie

Evolution

Persistence

Régression

**Prévention**

- photoprotection
- couverture des zones exposées

**Traitement**

- cryothérapie (azote liquide)
- Topique immunomodulateur (imiquimod)



# CE : aspects cliniques

Au début, « **kératose actinique** » qui ne guérit pas !



**Toute lésion érythémateuse bien circonscrite, même indolente doit faire suspecter un CSC et être biopsiée**

**Puis**

**aspects variables** selon le degré de différenciation

**de la corne cutanée bien limité**  
(CE bien différencié)



**à la tumeur bourgeonnante, ulcérovégétante**  
(CE indifférencié)

